

CMYK: 30 90 90 0  
RGB: 183 56 44  
WEB: b7382c

CMYK: 0 70 70 0  
RGB: 237 105 75  
WEB: ed694b

#263144  
C86 M74 Y49 K40  
R38 G49 B68

#### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.
- H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
- P405: Armazenar em local fechado à chave.
- P501A: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

UFI: HR40-R07V-X009-6NME

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250.

•SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

•SPe3: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em citrinos e bananeira 10 metros em pomóideas e prunóideas, em relação às águas de superfície.

•SPe3: Para proteção de artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas, para citrinos, pomóideas, prunóideas e bananeira.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num centro de receção autorizado.



SUMMER OIL ULTRA é um acaricida e inseticida com base em óleo parafínico, não sistémico, de amplo espectro de acção, pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos alcanos. Actua principalmente por asfixia, cobrindo o corpo dos insectos com uma fina camada oleosa impermeável que bloqueia os canais traqueais, impedindo a respiração e provocando a sua morte.

#### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO.

**Citrinos (Laranjeira, tangerineira (incluindo mandarinas), limoeiro, lima e toranjeira):** Aranhão-vermelho-dos-citrinos (*Panonychus citri*); ácaro-do-texas (*Eutetranychus banksi*); aranhão-amarelo (*Tetranychus urticae*); cochonilha pinta vermelha (*Aonidiella aurantii*); Cochonilha-branca (*Aspidiotus nerii*); Cochonilha-virgula (*Lepidosaphes beckii*); Parlatoria (*Parlatoria pergandii*). Aplicar na concentração de 1 - 1,5 L/hL. Realizar as aplicações antes da mudança de cor dos frutos (BBCH 81) em presença da praga.

Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 1000-2000 L/ha.

**Prunóideas (Ameixeira, cerejeira, damasqueiro e pessegueiro (incluindo nectarinas):** Cochonilha de São José (*Quadraspidiotus perniciosus*). Aplicar na concentração de 0,75 - 1 L/hL. Realizar as aplicações antes do abrolhamento dos gomos florais (BBCH 53) em presença da praga.


Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 500-1500 L/ha.

**Pomóideas (Macieira, pereira, marmeleiro e pereira nashi):** Cochonilha de São José (*Quadraspidiotus perniciosus*). Aplicar na concentração de 0,75 - 1 L/hL. Realizar as aplicações antes do início da floração (BBCH 60) em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 500-1500 L/ha.

PERIGO



SARABIA

# SUMMER OIL ULTRA

ACARICIDA E INSETICIDA  
CONCENTRADO PARA EMULSÃO (EC)

Para o controle de ácaros e  
cochonilhas em várias culturas

Composição:  
790g/L o 94,05% (p/p) de óleo parafínico

Este produto pode ser usado  
em Modo de Produção Biológico

Autorização de venda n.º 1060,  
concedida pela DGAV

CAPACIDADE:  
**25 L**

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL.  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.  
MANter FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Titular da autorização de venda:

SARABIA®

Distribuído por:

CADUBAL

EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.

Polígono Industrial Fondo de Litera, A2, km 411,6  
22520 Fraga (Huesca), Espanha Telefone: (+34) 973 73 73 77  
© Marca registrada por Sarabia.

Cadubal – Companhia de adubos, SA

Zona Industrial F1 - Neiva - 4935-231 Viana do Castelo  
Telefone - 258350300  
Email - geralcadubal@cadubal.com

**Oliveira:** Cochonilha-negra (= cochonilha-H) (*Saissetia oleae*). Aplicar na dose de 15 L/ha. Realizar os tratamentos em presença da praga ou desde a colheita até ao início da floração (BBCH 00-59), ou após a queda das pétalas até o fruto atingir tamanho superior a 50% (BBCH 71-75).

Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 500-1500 L/ha.

**Videira:** Cochonilha-da videira (*Parthenolecanium corni*), Cochonilha-algodão-da-videira (*Planococcus ficus*) Realizar tratamentos de inverno. Aplicar em pré-floração (BBCH 00-57) e em presença da praga. Aranhão-amarelo (*Tetranychus urticae*), Aranhão-vermelho (*Panonychus ulmi*) Aplicar ao aparecimento dos primeiros adultos.

Aplicar na dose de 15 L/ha Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 500-1500 L/ha.

**Bananeira:** Aranhão-amarelo (*Tetranychus urticae*) Aplicar no início da primavera, quando surgem os primeiros adultos. Cochonilha algodão (*Dysmicoccus grassii*) Aplicar no início da floração em presença da praga. Aplicar na dose de 30 L/ha.

Realizar no máximo 1 tratamento.

Volume de calda: 1500-2500 L/ha.

#### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

•Não aplicar antes de perfazer 40 dias após a realização de tratamentos com enxofre, polienxofre, polisulfito de cálcio, captana e folpete. Não efetuar misturas com estes produtos.

•Ter especial cuidado em garantir a adequada cobertura da vegetação pelo produto, evitando excessos de calda.

•Não aplicar em dias quentes e secos.

•SUMMER OIL ULTRA é também eficaz no combate a fumagina, limpando a vegetação.

#### PREPARAÇÃO DA CALDA

Agitar a embalagem antes de usar.

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua. Manter a agitação em funcionamento durante toda a aplicação. Preparar apenas a quantidade de calda de que irá necessitar.

Não deixar a calda no tanque do pulverizador durante muito tempo.

#### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento.

**NOTA:** As recomendações e informações facultadas são o resultado de estudos e ensaios, amplos e rigorosos. Contudo, numerosos fatores fora do nosso controlo podem intervir durante o seu uso (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável por estragos (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc) causados pela não observância total ou parcial das instruções contidas no rótulo.

Nº. de lote e data de produção:  
ver na embalagem

Edição: 1/2023  
SBv2